

# ENDLICH SCHLUSS MIT SCHWEISS UND GERUCH

Als einzige von der FDA zugelassene Behandlung bekämpft miraDry® die Ursache von Achselschweiß und -geruch – nicht nur die Symptome.

## Reduzieren Sie Achselschweiß und -geruch dauerhaft

**82%** durchschnittliche Schweißreduktion nach 12 Monaten<sup>1,2</sup>

**89%** Geruchsreduzierung nach 24 Monaten<sup>1,2</sup>

### Was ist miraDry?

Die miraDry-Behandlung ist ein Verfahren ohne operativen Eingriff, das von geschultem medizinischen Fachpersonal in nur einer Stunde durchgeführt wird.

### Optimale Ergebnisse mit miraDry



### Wie funktioniert miraDry?

1

#### BETÄUBUNG

Eine lokale Betäubung sorgt für maximalen Komfort während der Behandlung.

2

#### MARK IT

Die Haut wird zur Vorbereitung auf die Behandlung mit einem temporären Tattoo gekennzeichnet.

3

#### BEHANDLUNG

Der Bereich wird mit miraDry behandelt, wodurch Schweiß- und Geruchsdrüsen im Achselbereich beseitigt und Achselhaare reduziert werden.



Schließen Sie sich den weltweit über **550.000** behandelten Patienten an  
**Fragen Sie noch heute nach einer miraDry-Beratung!**

Quellen:

Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis (Klinische Bewertung eines Mikrowellengeräts zur Behandlung der axillären Hyperhidrose). Hong et al; Dermatologic Surgery 2012.  
Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device (Langfristige Wirksamkeit und Bewertung der Lebensqualität bei der Behandlung der axillären Hyperhidrose mit einem Mikrowellengerät). Dermatol Surg. 2014;40(7):805-807.

Das miraDry-System wurde von der FDA zur Behandlung einer primären axillären Hyperhidrose (übermäßiger Achselschweiß) und der dauerhaften Entfernung von Achselhaaren zugelassen. Es kann auch Achselgeruch reduzieren. Sie sollten von der Behandlung mit miraDry absehen, wenn Sie einen Herzschrittmacher oder ein anderes elektronisches Gerät implantiert haben, zusätzlichen Sauerstoff benötigen oder eine bekannte Resistenz oder Unverträglichkeit gegenüber Lokalanästhetika, wie Lidocain und Epinephrin, haben. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Schwellungen, Unwohlsein oder Schmerzen, Rötungen, Blutergüsse, Beulen und eine veränderte Sensibilität im behandelten Bereich. Manche Nebenwirkungen können einige Tage bis Wochen anhalten. Andere können einen bis mehrere Monate nach der Behandlung andauern. Die Resultate und Erfahrungen der Patienten können variieren.

miraDry® ist eine Marke von miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Alle Rechte vorbehalten. MK2219B.A