

FINI LA TRANSPIRATION ET LES ODEURS

miraDry® est le seul traitement approuvé par la FDA conçu pour traiter la cause profonde de la transpiration et des odeurs au niveau des aisselles plutôt que les symptômes.

Réduisez définitivement la transpiration et les odeurs de vos aisselles

82% Réduction moyenne de la transpiration de 82 % après 12 mois^{1,2}

89% Réduction des odeurs de 89 % après 24 mois^{1,2}

Qu'est-ce que miraDry ?

Le traitement miraDry est une procédure non chirurgicale réalisée en seulement une heure par un professionnel de santé qualifié.

Des résultats optimaux avec miraDry



Comment fonctionne miraDry ?

1

ANESTHÉSIE

Une anesthésie locale est administrée pour assurer un confort maximal pendant la séance.

2

MARQUAGE

Un tatouage temporaire est appliqué pour marquer la peau en préparation au traitement.

3

TRAITEMENT

La zone est traitée avec miraDry, qui élimine les glandes responsables de la transpiration et des odeurs tout en réduisant la pilosité des aisselles.



Rejoignez les plus de **550 000** patients traités dans le monde
Demandez dès aujourd'hui une consultation miraDry!

Références :

Clinical Evaluation of a Microwave device for treating axillary hyperhidrosis (Évaluation clinique d'un dispositif à micro-ondes pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire). Hong et al ; Dermatologic Surgery 2012.
Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device (Evaluation à long terme de l'efficacité et de la qualité de vie suite au traitement de l'hyperhidrose axillaire par un dispositif à micro-ondes). Dermatol Surg. 2014;40(7):805-807.

Le système miraDry est autorisé par la FDA pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire (transpiration excessive des aisselles) et l'épilation permanente des aisselles. Il peut aussi réduire les odeurs provenant des aisselles. Le traitement miraDry ne convient pas aux personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté, qui ont besoin d'une supplémentation en oxygène ou qui présentent une résistance avérée ou des antécédents d'intolérance à des anesthésiques locaux, notamment la lidocaïne et l'épinephrine. Parmi les effets secondaires les plus courants, on peut observer un gonflement, une sensation d'inconfort ou de douleur, des rougeurs, des bleus, des bosses et une altération des sensations dans la zone traitée. Certains effets secondaires peuvent durer quelques jours à quelques semaines. D'autres peuvent durer un à plusieurs mois après le traitement. Les résultats et l'expérience des patients sont susceptibles de varier.

miraDry® est une marque commerciale de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Tous droits réservés. MK2219B.A