

HYPERHIDROSE IST EINE ERKRANKUNG, BEI DER MAN OHNE BESONDERE KÖRPERLICHE BEWEGUNG ODER WÄRME VON AUSSEN ÜBERMÄSSIG SCHWITZT

INFORMATIONEN ZUR HYPERHIDROSE:



Menschen weltweit leiden unter Hyperhidrose bzw. übermäßigem Schwitzen.²

4.8% der US-Bevölkerung hat Hyperhidrose.²



SCHON GEWUSST?

Die primäre axilläre Hyperhidrose ist die häufigste Form der Hyperhidrose³

Die primäre axilläre Hyperhidrose ist die lästigste Form der fokalen Hyperhidrose und kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.⁴


BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN

	Mikrowellenablation	Fettabsaugung per Kürettage (Operation)	Botulinumtoxin Injektion
Ausfallzeit	Kaum bis keine	Ausfallzeit nötig	30 minuten
Häufigkeit	Permanente Lösung	Permanente Lösung	Vierteljährlich
Kosten	\$ \$	\$ \$ \$ \$	\$ \$ \$

ZUR DAUERHAFTEN REDUKTION DER PRIMÄREN AXILLÄREN HYPERHIDROSE GIBT ES NUR EIN VON DER FDA ZUGELASSENES MEDIZINPRODUKT

Studie zum Vergleich der Behandlungsmöglichkeiten der primären axillären Hyperhidrose

Die Mikrowellenablation hat eine hohe Wirksamkeit und hält lange an, wodurch sie die Botulinumtoxin-Injektion und die Fettabsaugung per Kürettage (Operation) übertrifft.⁵



Mittlere gewichtsanalytische Verbesserung in Prozent im Zeitverlauf nach der Behandlung mit Botulinumtoxin, durch Fettabsaugung per Kürettage und durch Mikrowellenablation.

WORAN MAN ERKENNT, DASS EIN PATIENT FÜR EINE AXILLÄRE MIKROWELLENTHERAPIE INFRAGE KOMMT:

- Berichtet über Bewältigungsmechanismen (z. B. das Tragen spezieller Kleidung, um Schweißflecken zu verbergen)
- Sichtbarer Schweiß oder Schweißflecken
- Erprobte und erfolglose topische oder orale Medikation
- Empfänger regelmäßiger Botulinumtoxin-Injektionen
- Übermäßiges Schwitzen an anderen Körperstellen

WIE MAN BEZÜGLICH DER BEHANDLUNG DER PRIMÄREN AXILLÄREN HYPERHIDROSE FÜR POSITIVE PATIENTENERFAHRUNGEN SORGT

- Wert oder Nutzen einer dauerhaft wirksamen Behandlung hervorheben
- Zahlungsoptionen oder Finanzierungspläne bereitstellen
- Erwartungen an die Behandlung abstecken
- Beratung vor und nach der Behandlung
- Nachsorgeuntersuchungen und gegebenenfalls weitere Behandlung

Scannen Sie den QR-Code, um mehr über eine dauerhaft wirksame Behandlung zu erfahren.



Quellenangaben: 1. Data on file. miraDry, Inc. 2. International Hyperhidrosis Society, [sweathelp.org](https://www.sweathelp.org/) <https://www.sweathelp.org/> 3. Glaser, D. A., Ballard, A. M., Hunt, N. L., Pieretti, L. J., & Pariser, D. M. (2016). Prevalence of Multifocal Primary Hyperhidrosis and Symptom Severity Over Time: Results of a Targeted Survey. *Dermatologic surgery: offizielle Publikation für American Society for Dermatologic Surgery* [et al.], 42(12), 1347–1353. 4. Muthusamy, A., Gajendran, R., Ponnann, S., Thangavel, D., & Rangan, V. (2016). A Study on the Impact of Hyperhidrosis on the Quality of Life among College Students. *Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR*, 10(6), CC08–CC10. 5. Parrish, C., Waldbaum, B., Coleman, D., Blevins, C., Rodgers, K., Lee, B., Ober, C., Hudhud, L., Cox, S., Griffin, C., Chew, S., Chen, B., & Brock, M. (2020). Microwave Thermolysis Reduces Generalized and Social Anxiety in Young Adults With Axillary Hyperhidrosis. *Lasers in surgery and medicine*, 52(9), 842–847. 6. Marwan W. Nasr, Samer F. Jabbour, Roger N. Haber, Elio G. Kechichian & Lena El Hachem (2017) Comparison of microwave ablation, botulinum toxin injection, and liposuction-curettage in the treatment of axillary hyperhidrosis: A