

HYPERHIDROS ÄR ETT TILLSTÅND DÄR EN PERSON SVETTAS ÖVERDRIVET MYCKET, UTAN ATT DET ÄR RELATERAT TILL TRÄNING ELLER VÄRME.

INSIKTER OM HYPERHIDROS:



människor över hela världen lider med hyperhidros eller överdriven svettning.²

4.8%

av den amerikanska befolkningen påverkas av hyperhidros.²



VISSTE DU DET?

Primär axillär hyperhidros är den vanligaste typen av hyperhidros³

Primär axillär hyperhidros är den mest besvärande typen av fokal hyperhidros och kan ha en betydande inverkan på livskvaliteten.⁴


FÖRSTÅ BEHANDLINGSMÖJLIGHETER

			
	Mikrovågsablation	Fettsugning-curettage (Kirurgi)	Botulinumtoxin Injektion
Stilleståndstid	Lite till inget	Nödvändig stilleståndstid	30 minuter
Frekvens	Permanent lösning	Permanent lösning	Kvartalsvis lösning
Kostnad	\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$

DET FINNS ENDAST EN FDA-GODKÄND MEDICINTEKNISK PRODUKT FÖR PERMANENT MINSKNING AV PRIMÄR AXILLÄR LÄR HYPERHIDROS.

En studie som jämför behandlingsalternativ för primär axillär hyperhidros

Mikrovågsablation har hög effektivitet och överlägsen varaktighet som överträffar botulinumtoxininjektion och fettsugning-curettage (kirurgi).⁵



Genomsnittlig gravimetrisk förbättringspercent över tid efter behandling med botulinumtoxin, fettsugning-skurettage och mikrovågsablation.

NÄR MAN IDENTIFIERAR EN PATIENT SOM ÄR LÄMPLIG FÖR MIKROVÅGSBEHANDLING UNDER ARMHÅLORNA:

- Rapporterar hanteringsmekanismer (t.ex. bär speciella kläder för att dölja sina svettfläckar)
- Synligt märkbar svett eller svettfläckar
- Provade och misslyckades med topisk eller oral medicinering
- Får ofta botulinumtoxininjektioner
- Upplever överdriven svettning i andra delar av kroppen

GE EN POSITIV PATIENTUPPLEVELSE VID PRIMÄR BEHANDLING AV AXILLÄR HYPERHIDROS:

- Betona värdet eller fördelarna med varaktig behandling
- Ge betalningsalternativ eller finansieringsplaner
- Ställ upp förväntningar på behandlingen
- Rådgivning före och efter vårdtillfället
- Uppföljningsbesök och vid behov ytterligare behandling.

Skanna QR-koden för att få veta mer om en permanent behandling.



Referenser: 1. Data on file. miraDry, Inc. 2. International Hyperhidrosis Society, [sweathelp.org](https://www.sweathelp.org/) <https://www.sweathelp.org/> 3. Glaser, D. A., Ballard, A. M., Hunt, N. L., Pieretti, L. J., & Pariser, D. M. (2016). Prevalence of Multifocal Primary Hyperhidrosis and Symptom Severity Over Time: Results of a Targeted Survey. *Dermatologic surgery* : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 42(12), 1347–1353. 4. Muthusamy, A., Gajendran, R., Ponnann, S., Thangavel, D., & Rangan, V. (2016). A Study on the Impact of Hyperhidrosis on the Quality of Life among College Students. *Journal of clinical and diagnostic research* : JCDR, 10(6), CC08–CC10. 5. Parrish, C., Waldbaum, B., Coleman, D., Blevins, C., Rodgers, K., Lee, B., Ober, C., Hudhud, L., Cox, S., Griffin, C., Chew, S., Chen, B., & Brock, M. (2020). Microwave Thermolysis Reduces Generalized and Social Anxiety in Young Adults With Axillary Hyperhidrosis. *Lasers in surgery and medicine*, 52(9), 842–847. 6. Marwan W. Nasr, Samer F. Jabbour, Roger N. Haber, Elio G. Kechichian & Lena El Hachem (2017) Comparison of microwave ablation, botulinum toxin injection, and liposuction-curettage in the treatment of axillary hyperhidrosis: A