



EL SUDOR Y EL OLOR SE ACABAN AQUÍ

Resultados óptimos con miraDry



ANTES



DESPUÉS

UNA SOLUCIÓN CLÍNICAMENTE PROBADA

Resultados en tan solo un tratamiento, con alta satisfacción del paciente después de solo dos tratamientos.


82%

Reducción del sudor a los 12 meses^{1,2}

89%

Ya no sufren molestias por el olor a los 24 meses^{1,2}

PARA REDUCIR PERMANENTEMENTE EL SUDOR Y EL OLOR DE LAS AXILAS



Reducción



Inmediato



Tratamiento

Consulte con su médico si miraDry® es adecuado para usted.

Referencias: 1. Hong HC, Lupin M, O'Shaughnessy KF. Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2012;38(5):728-735.
2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device. Dermatol Surg. 2014; 40(7):805-807.

El sistema miraDry ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de la hiperhidrosis axilar primaria (sudoración excesiva de las axilas) y la eliminación permanente del vello de las axilas. También puede reducir el olor de las axilas.

No debe someterse al tratamiento miraDry si tiene un marcapasos cardíaco u otro dispositivo electrónico implantado, si necesita oxígeno suplementario o si tiene alergia conocida o antecedentes de intolerancia a la anestesia local (lidocaína y epinefrina incluidas). Los efectos secundarios más frecuentes incluyen hinchazón, molestias o dolor, enrojecimiento, hematomas, abultamientos y alteración de la percepción en la zona tratada. Algunos efectos secundarios pueden durar de unos días a unas semanas. Otros pueden durar de uno a varios meses tras el tratamiento. Los resultados y la experiencia del paciente pueden variar.

miraDry® es una marca comercial de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. MK25201.A