



O SUOR E O MAU CHEIRO ACABAM AQUI

Resultados ideais com o miraDry



ANTES



DEPOIS

UMA SOLUÇÃO CLINICAMENTE COMPROVADA

Resultados visíveis após apenas um tratamento, com elevada satisfação dos pacientes após dois tratamentos.


82%

Redução do suor
aos 12 meses^{1,2}

89%

Sem incómodo com o odor
aos 24 meses^{1,2}

PARA REDUZIR PERMANENTEMENTE O SUOR E O ODOR NAS AXILAS



Permanentes



Imediato



Não cirúrgico

Consulte o seu profissional de saúde para saber se o miraDry® é adequado para si.

Referências: 1. Hong HC, Lupin M, O'Shaughnessy KF. Avaliação clínica de um dispositivo de micro-ondas para o tratamento da hiperidrose axilar. Dermatol Surg. 2012;38(5):728-735. 2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Avaliação da eficácia a longo prazo e da qualidade de vida para o tratamento da hiperidrose axilar com um dispositivo de micro-ondas. Dermatol Surg. 2014;40(7):805-807.

O sistema miraDry é aprovado pela FDA para o tratamento de hiperidrose axilar primária (suor excessivo na zona axilar) e a remoção permanente dos pelos axilares. Também é capaz de reduzir o odor nas axilas.

Não deve realizar o tratamento miraDry se tiver um pacemaker ou outro implante cardíaco eletrônico, se necessitar de oxigénio suplementar ou se tiver conhecimento de resistência ou histórico de intolerância à anestesia local, incluindo lidocaína e epinefrina. Os efeitos secundários mais comuns incluem inchaço, desconforto ou dor, vermelhidão, nódulos negros, inchaços e sensação alterada na área tratada. Alguns efeitos secundários podem durar de alguns dias a algumas semanas. Outros podem durar de um a vários meses após o tratamento. Os resultados e a experiência dos pacientes podem variar.

miraDry® é uma marca comercial da miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as outras marcas registadas pertencem aos respetivos proprietários. MK25201.A