



# AUX PRISES AVEC LA TRANSPIRATION ET LES ODEURS ?

## L'HYPERHIDROSE N'EST PAS UN CHOIX, MAIS SON TRAITEMENT L'EST

Lorsque la transpiration et les odeurs perturbent votre quotidien, il est peut-être temps d'envisager des solutions plus efficaces que les traitements topiques.



## UNE SOLUTION CLINIQUEMENT PROUVÉE

miraDry® est le seul traitement non chirurgical approuvé par la FDA conçu pour réduire de manière permanente la transpiration, les odeurs et la pilosité des aisselles.


82%

Réduction de la  
transpiration après  
12 mois<sup>1,2</sup>

89%

Plus aucune gêne due aux  
odeurs après 24 mois<sup>1,2</sup>

## POUR RÉDUIRE DÉFINITIVEMENT LA TRANSPIRATION ET LES ODEURS AU NIVEAU DES AISSELLES



Définitif



Immédiat



Non chirurgical

**Demandez à votre médecin si miraDry® est  
adapté à votre cas.**

Références : 1. Hong HC, Lupin M, O'Shaughnessy KF. Clinical evaluation of a microwave device for treating axillary hyperhidrosis. Dermatol Surg. 2012;38(5):728-735.  
2. Lupin M, Hong HC, O'Shaughnessy KF. Long-term efficacy and quality of life assessment for treatment of axillary hyperhidrosis with a microwave device (Évaluation à long terme de l'efficacité et de la qualité de vie suite au traitement de l'hyperhidrose axillaire par un dispositif à micro-ondes). Dermatol Surg. 2014;40(7):805-807.

Le système miraDry est autorisé par la FDA pour le traitement de l'hyperhidrose axillaire primaire (transpiration excessive des aisselles) et l'épilation permanente des aisselles. Il peut aussi réduire les odeurs provenant des aisselles.

Le traitement miraDry ne convient pas aux personnes qui ont un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif électronique implanté, qui ont besoin d'une supplémentation en oxygène ou qui présentent une résistance avérée ou des antécédents d'intolérance à des anesthésiques locaux, notamment la lidocaïne et l'épinéphrine. Parmi les effets secondaires les plus courants, on peut observer un gonflement, une sensation d'inconfort ou de douleur, des rougeurs, des bleus, des bosses et une altération des sensations dans la zone traitée. Certains effets secondaires peuvent durer quelques jours à quelques semaines. D'autres peuvent durer un à plusieurs mois après le traitement. Les résultats et l'expérience des patients sont susceptibles de varier.

miraDry® est une marque commerciale de miraDry, Inc. © 2026 miraDry, Inc. Tous droits réservés. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MK25200.A